









Arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines

Liste des espèces offertes en 2017

| | Espèce | Exposition | Humidité du sol | Taille à maturité | Emplacement sur la rive | Description |
|--|---|---|-----------------|----------------------------|-------------------------|---|
|  | <p>Myrique baumier <i>Myrica gale</i></p> |  | Élevée | <p>↔ 2 m ↕ 1,2 m</p> | < 2 m de la rive | <ul style="list-style-type: none"> • Les racines doivent avoir accès à l'eau • Tolère les inondations printanières • Propriétés brise-glace |
|  | <p>Saufe arbustif <i>Salix spp</i></p> |  | Élevée | <p>↔ 2,5 m ↕ 2,5 m</p> | Partout | <ul style="list-style-type: none"> • Tolère les inondations printanières • Peut être taillé • Croissance rapide et excellente stabilisation du sol |
|  | <p>Dierville Chèvrefeuille <i>Diervilla Lonicera</i></p> |  | Faible | <p>↔ 1 m ↕ 1 m</p> | < 2 m de la rive | <ul style="list-style-type: none"> • Petit arbuste aux branches légèrement retombantes • Fleurs jaunes en clochettes (été) |
|  | <p>Viorne cassinoïde <i>Viburnum cassinoides</i></p> |  | Élevée | <p>↔ 1,2 m ↕ 1,5 m</p> | < 1 m de la rive | <ul style="list-style-type: none"> • Port buissonnant, idéal en massif et pour la renaturalisation • Fleurs blanches en corymbes (juin) • Fruits rouges-bleutés attirant les oiseaux (automne) |